

Avril 2024


Ne pas confondre vitesse et précipitation.

Sur le calendrier que m'a laissé le facteur, j'ai bien vu que le printemps c'était le 20 mars.
Les abeilles, elles, n'ont pas besoin du calendrier du facteur. Elles ont bien compris que la belle saison pointait son nez.
En profitant d'une belle journée ensoleillée, nous sommes donc repartis au rucher pour la fameuse **VISITE DE PRINTEMPS** et nous avons pu faire un état des lieux sur notre rucher.
Peut-être que nous avons vu des ruches bien peuplées et que nous avons posé une hausse.

Attention aux nuits fraîches. Posons les **hausse sur deux feuilles** de papier journal ou sur le nourrisseur. Les abeilles monteront SI BESOIN.

NE nous PRECIPITONS PAS pour les DIVISIONS! **Attendons les belles journées pour diviser les colonies.** Le mois de mars est capricieux! Si on divise une ruche et que la météo se met au mauvais temps on ne gagne que des ennuis sur le rucher.

Aujourd'hui, nous avons la chance d'**avoir des prévisions météo**, ne les négligeons pas avant de nous précipiter au rucher.



1 2 3 4 5
1 Miel
2 Couvain
3 Couvain
4 Miel
5 Partition

Plan-plan Ecophyto

Les dernières semaines de février ont été occupées par une actualité envahie de vieux pneus, de remorques de fumier déversé et de blocages fermiers.

On accuse quelquefois nos parlementaires de tous les maux mais certains d'entre eux produisent des travaux qui méritent publicité.

Je vous invite à lire [ce rapport](#).

Après lecture, on perçoit bien mieux les attentes de la société toute entière et la Révolution que devra tôt ou tard opérer l'agriculture. Ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas durable, c'est heureusement, destiné à disparaître.

Diviser c'est multiplier

OSEZ!

OUI, osez vous lancer dans les divisions!

Quand? Par une très belle journée d'avril!

Quelques méthodes.

Méthode 1 : voici [le lien ICI](#)

Méthode expliquée par Gilles FERT

Méthode 2 : voici [le lien ICI](#)

Méthode de L'abeille limousine qui consiste à faire un essaim en utilisant deux ruches. L'une pour les cadres de couvain et de nourriture, l'autre pour les butineuses.

Dans tous les cas, partez au rucher avec du SIROP pour nourrir les divisions.

Et n'oubliez pas de traiter varroa pendant que le nucleus orphelin est sans couvain.

